

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата Флорфеникол 10% оральный для
лечения свиней и сельскохозяйственных птиц при болезнях
бактериальной и микоплазменной этиологии

(Организация-разработчик: ООО «Ареал Медикал»,
129329, Россия, г. Москва, Кольская ул., 1)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Флорфеникол 10% оральный (Florfenicol 10% oral).

Международное непатентованное наименование: флорфеникол.

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.

Флорфеникол 10% оральный в 1 мл в качестве действующего вещества содержит 100 мг флорфеникола, а в качестве вспомогательных веществ 1-метил-2-пирролидон и пропиленгликоль.

3. По внешнему виду Флорфеникол 10% оральный представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Срок годности Флорфеникола 10% орального в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – не более 30 суток. Не применять по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 100 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновой пробкой и обкатанные алюминиевыми колпачками; по 100 и 250 мл в полимерные флаконы, по 0,5 и 1 л в полимерные бутылки соответствующей вместимости и по 2,5 и 5 л в полимерные канистры, укупоренные навинчивающимися пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Флорфеникол 10% оральный хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.

6. Хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Флорфеникол 10% оральный относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы фениколов.

10. Флорфеникол, входящий в состав лекарственного препарата, является производным тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа заменена атомом фтора.

Флорфеникол проявляет бактериостатическое действие в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Ornitobacterium rhinotracheale*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.*, и микоплазм *Mycoplasma spp.* Активен в отношении бактерий, которые вырабатывают ацетилтрансферазу и являются устойчивыми к хлорамфениколу.

Флорфеникол связывается с 70-S субъединицей рибосом в протоплазме бактериальной клетки, где блокирует действие фермента пептидилтрансферазы, что приводит к подавлению синтеза протеинов чувствительных бактерий.

После перорального введения флорфеникол быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и тканей. Максимальная концентрация антибиотика в крови птиц и свиней достигается через 1-1,5 часа и сохраняется в организме на терапевтическом уровне до 24 часов после применения препарата. Выводится флорфеникол из организма в неизмененной форме и в виде метаболитов, преимущественно с фекалиями, у яйценоской птицы - также с яйцами.

Флорфеникол 10% оральный по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Флорфеникол 10% оральный назначают:

- свиньям для лечения заболеваний органов дыхания бактериальной этиологии: плевропневмонии, вызванной *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, атрофического ринита, вызванного *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, а также других инфекционных заболеваний свиней бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу, и вторичных бактериальных инфекций;

- птицам для лечения колибактериоза, пастереллеза, болезней органов дыхания бактериальной этиологии у птиц, в том числе вызванных *Ornitobacterium rhinotracheale*, стафиллококкоза и других инфекционных болезней, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу, а также вторичных бактериальных инфекций.

12. Запрещается применение лекарственного препарата племенным хрякам, курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки в виду накопления флорфеникола в яйцах. Лекарственный препарат нельзя применять в случае индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата.

13. Флорфеникол 10% оральный применяют свиньям индивидуально или групповым способом с водой для поения в суточной дозе 5 мл лекарственного препарата на 100 кг массы животного (что соответствует 5 мг флорфеникола на 1 кг массы животного) в течение 7 суток.

Птицам применяют групповым способом с водой для поения в суточной дозе: цыплятам в возрасте до 4-х недель - 100 мл препарата на 100 л воды; другим возрастным категориям птицы - 200 мл препарата на 100 л воды (что соответствует 20 мг флорфеникола на 1 кг массы птицы) в течение 3 суток, а при сальмонеллезе и смешанных инфекциях - в течение 5 суток.

При групповом способе применения свиньи и птицы должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. В случае, когда это невозможно, суточную дозу делят на 2 равные части и задают с интервалом 12 часов.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата могут проявляться возбуждением, которое сменяется угнетением; появляется учащенное дыхание и сердцебиение, цианоз слизистых оболочек. Лечение симптоматическое.

15. Особеностей действия при первом применении Флорфеникола 10% орального и при его отмене не отмечено.

16. Запрещается применение препарата поросятам массой менее 2 кг, супоросным и лактирующим свиноматкам.

17. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата его применение возобновляют в тех же дозах и схеме лечения.

18. Побочных явлений и осложнений у птиц при применении Флорфеникола 10% орального в соответствии с настоящей инструкцией не установлено. У свиней возможно изменение цвета фекалий, диарея, покраснение и припухлость перианальной области. Указанные симптомы проходят самопроизвольно после окончания применения препарата.

В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и, при необходимости, симптоматическое лечение.

19. Не допускается применение Флорфеникола 10% орального одновременно с тиамфениколом и хлорамфениколом, антибиотиками группы пенициллина, цефалоспоринами и фторхинолонами.

20. Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток, птиц – не ранее, чем через 2 суток после последнего применения Флорфеникола 10% орального. Мясо свиней и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Флорфениколом 10% оральным следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

22. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Флорфениколом 10% оральным. Упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Центральная, д. 1.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Центральная, д. 1.

Номер регистрационного удостоверения: 47-329.13-1773 М7ВР-3-29.13/02983

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Флорфеникола 10% орального, утвержденная Россельхознадзором 13.01.2014.