

Рассмотрено на заседании
Ветбиофармсовета
Протокол №61
от «24» января 2012 года.

Инструкция по применению препарата ЛЕТОЗАЛ в ветеринарии

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Летозал (Letosalum).
- 1.2 Комплексной препарат, в состав которого входит бутафосфан и витамин В₁₂. В 1 см³ препарата содержится 100 мг бутафосфан, 0,05 мг витамина В₁₂.
- 1.3 Препарат представляет собой стерильный прозрачный раствор розового цвета.
- 1.4 Препарат упаковывают в стеклянные флаконы по 50 см³, 100 см³.
- 1.5 Хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от + 5 до + 25°C. Срок годности препарата: 2 года от даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Летозал обладает тонизирующими свойствами, оказывает стимулирующее действие на процессы обмена веществ (белковый, углеводный, жировой обмен), повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам, способствует росту и развитию животных.

2.2 Препарат относится к IV классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Летозал назначают:

- при нарушении обмена веществ разной этиологии у животных и птиц.
- для профилактики бесплодия у коров и свиноматок (тетания, родильный парез), как тонизирующее средство при родах у коров и свиноматок.
- для стимуляции роста телят, поросят и цыплят; терапии вторичных анемий у поросят.
- для повышения сопротивляемости организма в качестве вспомогательной терапии при интоксикациях, вирусных и бактериальных инфекциях, поражении органов и систем у животных и птиц.

3.2 Летозал применяют животным один раз в сутки внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно), птице - перорально. Длительность применения препарата составляет 4-5 дней.

3.3 Разовые дозы препарата составляют:

Животное	Доза (мл на животное)
Крупный рогатый скот	10,0-25,0
Телята	5,0-12,0
Свиньи	2,5-10,0
Поросята	1,0-2,5
Бройлеры, куры-несушки	2,0 - 3,0 мл на 1 л питьевой воды
Цыплята, молодняк	1,0 -1,5 мл на 1 л питьевой воды

3.4 При хронических болезнях назначают 1/2 дозы Летозала, указанной в таблице. При необходимости проводят повторный курс лечения с интервалом 7-14 дней.

3.5 Побочное действие. Летозал не вызывает у животных осложнений и не оказывает побочных действий при применении в соответствии с инструкцией.

3.6 Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

3.7 Сроки ожидания. Убой животных после применения препарата и использование жи-

вотноводческой продукции без ограничений.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые меры личной гигиены и правила техники безопасности.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, не менее 3-х невскрытых флаконов препарата из серии, вызвавшей осложнение, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов г. Минск, ул. Красная 19-а, тел.: 290-42-75.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И АДРЕС

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Летуаль» Республика Беларусь, 220005, г. Минск, пр-т Независимости, д.43, оф. 1-9.

Инструкция по применению разработана инженером-технологом ПК «Биогель», Р Б, г. Минск, Яхновцом В.В. и старшим научным сотрудником отдела токсикологии и незаразных болезней животных РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» А.Н. Безбородкиным.