

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Беафар ошейника инсектоакарицидного
для кошек
(организация-разработчик фирма «Beaphar B.V.», Нидерланды)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек (Beaphar collar insectoakaricidal for Cat).

Международное непатентованное наименование: Диазинон.

2. Лекарственная форма: инсектоакарицидный ошейник

Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение диазинон (15%), а также вспомогательные компоненты - поливинилхлоридную смесь «С натурель» (82,1%), эпоксидированное соевое масло (1,4%), лаурат бария (0,6%), мятое масло (0,8%), краситель руспринтекс Е 153 или эритрозин Л Е-127 (0,1%).

По внешнему виду препарат представляет собой полихлорвиниловую ленту с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению животного.

Выпускают Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек длиной 35 см в герметично закрытом полимерном пакете, помещенном в картонную коробку с инструкцией по применению.

3. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5⁰С до 30⁰С.

4. Срок годности Беафар ошейника инсектоакарицидного для кошек при соблюдении условий хранения - 4 года со дня производства.

Запрещается использовать Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек по истечении срока годности.

5. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Фармакологическая группа – инсектоакарицидное средство. Диазинон, входящий в состав ошейника, выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и оказывает контактное инсектоакарицидное действием на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), вшей (*Linognathus setosus*), власоедов (*Trichodectes canis*) и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия диазинаона заключается в ингибиовании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насекомых (вшей, кровососок и др.) и клещей (саркоптоидных, иксодовых), в результате чего происходит паралич и гибель эктопаразитов.

Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек по степени воздействия на организм животных относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает резорбтивно-токсического, местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

8. Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек применяют кошкам и котятам старше 6-месячного возраста для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей.

9. Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек не следует применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим и беременным кошкам, а также котятам моложе 6-месячного возраста.

10. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и надевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0-1,5 см, затем закрепляют фиксатором, и излишки ленты срезают.

В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей на животное, но через 2-3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.

Постоянное ношение Беафар ошейника инсектоакарицидного для кошек обеспечивает защиту собак от насекомых и иксодовых клещей не менее 5 месяцев.

При сильной степени заражения животного насекомыми перед применением Беафар ошейника инсектоакарицидного для кошек животное целесообразно вымыть инсектицидным шампунем, а подстилки обработать инсектицидным средством в соответствии с инструкциями по применению.

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

12. Особеностей действия в начале ношения ошейника и при его снятии не установлено.

13. Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек применяется однократно.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Беафар ошейника инсектоакарицидного для кошек в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к диазинону, возможны индивидуальные реакции (избыточная слюнотделение, слезотечение, признаки раздражения кожи), в этих случаях использование ошейника прекращают, животное следует вымыть с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

15. Не следует одновременно применять другие инсектоакарицидные препараты.

16. Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Беафар ошейником инсектоакарицидным для кошек необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы с лекарственным препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

18. Владельцу животного при наличии на руках порезов и ссадин при манипуляциях с Беафар ошейником инсектоакарицидным для кошек следует пользоваться резиновыми перчатками. Животное с Беафар ошейником инсектоакарицидным для кошек не следует подпускать к маленьким детям, особенно к трудным младенцам.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Беафар ошейником инсектоакарицидным для кошек. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: фирма «Beaphar B.V.»; P.O. Box 7, 8100 AA Raalte, Holland.

Инструкция разработана компанией «Beaphar Eastern Europe, s.r.o.» (Чешская Республика) совместно с фирмой «Beaphar B.V.» (Нидерланды).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Беафар ошейника инсектоакарицидного для кошек, утвержденная Россельхознадзором 02.12.2008 г.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Представитель компании
«Beaphar Eastern Europe, s.r.o.», Чехия

Кинкор Маджумдер С.