

ИНСТРУКЦИЯ
по применению капель ушных Отоферонол для профилактики и лечения
отитов бактериальной этиологии у собак и кошек

(Организация-разработчик: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: капли ушные Отоферонол (Guttae auriculares Otopheronol).

Международное непатентованное наименование: циклоферон.

2. Лекарственная форма: раствор для аурикулярного применения.

Капли ушные Отоферонол в качестве действующего вещества содержат циклоферон – 0,04%, а в качестве вспомогательных веществ изопропиловый спирт – 75%, полиэтиленоксид 400 – 10% и воду дистиллированную до 100%. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную с голубой опалесценцией жидкость, пенящуюся при встряхивании.

Выпускают капли ушные Отоферонол расфасованными в полимерные или стеклянные флаконы, укупоренные крышками-капельницами или резиновыми пробками, укреплёнными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон упаковывают в индивидуальную пачку из картона и снабжают инструкцией по применению.

3. Капли ушные Отоферонол хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0⁰С до 20⁰С.

4. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. После вскрытия упаковки хранить не более месяца при закрытой крышке или пробке.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

5. Капли ушные Отоферонол следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Капли ушные Отоферонол относятся к группе иммуномодулирующих препаратов. Входящий в состав капель ушных Отоферонол активный иммуномодулятор циклоферон является низкомолекулярным индуктором интерферона с широким спектром биологической активности (противовирусной, иммуномодулирующей, противовоспалительной). Иммуномодулирующий эффект циклоферона выражается в активации фагоцитоза,

естественных клеток-киллеров, цитотоксических Т-лимфоцитов, повышает неспецифическую резистентность организма в отношении вирусных и бактериальных инфекций.

Капли ушиные Отоферонол по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

8. Капли ушиные Отоферонол применяют собакам и кошкам для профилактики и лечения наружных и средних отитов бактериальной этиологии.

9. Противопоказанием к применению служит повышенная индивидуальная чувствительность животных к компонентам препарата.

10. Перед обработкой тщательно очищают ушиные раковины от поверхностных корок и струпьев тампоном, смоченным препаратом, а затем закапывают пипеткой в каждое ухо по 3-5 капель препарата (кошкам, маленьким собакам – по 3 капли, средним собакам – по 4 капли и крупным собакам – по 5 капель).

С целью более полной обработки всей поверхности уха и слухового прохода, ушную раковину складывают вдоль пополам и слегка массируют ее основание. Обработку проводят один раз в день в течение 8-10 дней.

При необходимости после недельного перерыва курс лечения повторяют.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках.

14. При применении капель ушных Отоферонол в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. Сведения о несовместимости капель ушных Отоферонол с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.

16. Капли ушиные Отоферонол не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с каплями ушными Отоферонол следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с каплями ушными Отоферонол. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д.20, литер "А".

Адрес производства: г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д. 20, литер "А".

Инструкция разработана: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д.20, литер "А".

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению капель ушных Отоферонол, утвержденную Россельхознадзором 21 декабря 2007 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения