

ИНСТРУКЦИЯ

по применению сыворотки «Витакан-С»
для профилактики и лечения инфекционных болезней собак

(организация-разработчик: ООО НПБЦ «Линия Альба», г. Москва)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование: сыворотка «Витакан-С».

Международное непатентованное название препарата: сыворотка «Витакан-С».

2. Лекарственная форма: жидкость для инъекций.

«Витакан-С» - сыворотка крови животных-доноров (собак), иммунизированных антигенами возбудителей, вызывающих чуму, парвовирусный энтерит и аденовирусные инфекции собак, содержащая специфические антитела к возбудителям этих заболеваний.

По внешнему виду сыворотка представляет собой светло-жёлтую жидкость. При хранении допускается образование незначительного осадка, который при взбалтывании легко разбивается в равномерную взвесь.

3. Сыворотка расфасована по 1-6 доз (3,0 - 18,0 мл) в стеклянные ампулы (флаконы) соответствующей вместимости. Флаконы герметично закупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Ампулы запаяны под вакуумом или инертным газом.

Флаконы (ампулы) с сывороткой упакованы в блистеры (коробки).

В каждую коробку (блистер) с препаратом должна быть вложена инструкция по применению.

Срок годности сыворотки «Витакан-С» 2 года с даты выпуска при указанных условиях хранения и транспортирования. По истечении срока годности препарат к применению не пригоден.

4. Сыворотку хранят и транспортируют в сухом, темном месте, при температуре от 2°C до 18°C.

5. «Витакан-С» следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Флаконы (ампулы) с препаратом без этикеток, с истёкшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с изменённым цветом и/или консистенцией содержимого, наличием посторонних примесей, а также остатки сыворотки, не использованные в день вскрытия флаконов (ампул), подлежат выбраковке и обеззараживанию путём кипячения в течение 30 минут с последующей утилизацией.

Утилизация обеззараженного препарата не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Сыворотка «Витакан-С» представляет собой гомологичную сыворотку крови животных-доноров (собак), содержащую антитела к возбудителям чумы, парвовирусного энтерита и аденовирусным инфекциям собак, которые при введении в организм вызывают формирование специфического иммунного ответа.

Пассивный иммунитет у собак после введения с профилактической целью сыворотки «Витакан-С» сохраняется не менее 2 недель.

Препарат обладает лечебными свойствами, максимально проявляющимися в инкубационном и продромальном периодах инфекционного процесса.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. «Витакан-С» применяют для профилактики и лечения чумы, парвовирусного энтерита и аденовирусных инфекций собак.

9. Сыворотку вводят подкожно или внутримышечно, соблюдая правила асептики и антисептики.

Для профилактики указанных вирусных болезней животным вводят 3,0 мл (1 дозу) глобулина двукратно с суточным интервалом. По истечении срока формирования пассивного иммунитета (2 недели) для создания активного иммунитета проводят вакцинацию.

С лечебной целью «Витакан-С» вводят в указанной дозе трёхкратно с интервалом 12-24 часа, в зависимости от тяжести состояния животного. Наибольший терапевтический эффект достигается при использовании препарата в начальной стадии болезни.

При конъюнктивитах, кроме подкожного введения, сыворотку применяют в виде глазных капель: закапывают 2-3 раза в сутки по 1-3 капли в каждый глаз. При ринитах глобулин закапывают в нос.

10. Сыворотка «Витакан-С» может быть назначена животному, независимо от его возраста и физиологического состояния (беременность, лактация и др.). Она не вызывает побочных реакций даже у породистых и изнеженных кошек. При использовании препарата для особо чувствительных животных с целью профилактики возникновения анафилактики рекомендуется дробное введение: вначале 0,5 мл, а затем, через 30-60 минут – оставшуюся дозу препарата.

Противопоказаний к применению препарата не выявлено.

11. Указанные схемы применения исключают возможность передозирования лекарственного препарата.

12. Допускается применение сыворотки «Витакан-С» одновременно с витаминами, антибиотиками, пробиотиками и другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения.

13. Сыворотку «Витакан-С» не применяют в одном шприце с другими биопрепаратами и лекарственными средствами.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

14. Работа с лекарственным препаратом не требует специальных мер предосторожности.

При работе с сывороткой «Витакан-С» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

15. Работа с препаратом проводится с использованием спецодежды индивидуальных средств защиты (халаты, колпачки, перчатки и др.).

16. При попадании сыворотки на кожу или слизистые оболочки рекомендуется промыть это место водопроводной водой. При случайном введении препарата человеку, место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта и обратиться в медицинское учреждение.

Инструкция разработана ООО НПБЦ «Линия Альба».

Организация - производитель: ООО НПБЦ «Линия Альба», 121059, г.Москва, Бережковская наб., д. 20

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению сыворотки «Витакан-С» для профилактики и лечения инфекционных болезней собак, утвержденная Россельхознадзором 29 декабря 2006 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения _____